

grödornas värdväxtstatus. Fler försök ger även här säkrare data.

Mellangrödor och ogräs

Flera försök utförda vid SLU i Alnarp har visat att annuella ogräs kan kontrolleras av till exempel oljerättika, honungsört och bovete. I detta projekt studeras hur ogräsen på hösten och följande vår påverkas i nedvintrande mellangrödor.

Mellangrödor och insekter

Kan mellangrödor fungera som gröna bryggor för insekter som löss, knäpparlarver och trips? Trips är allätare och kan bland

annat livnära sig på Brassica-grödor, till exempel oljerättika vilket gör den till en bra plats att övervintra på. Oljerättika, bovete och råg är även värdväxter för löss som persikbladlusen och betbladlusen. Knäpparlarver är ett ökande problem både i Sverige och utomlands och mer kunskap behövs hur de påverkas av olika mellangrödor. Hälften av de undersökta fälten kommer att ligga i det danska odlingsområdet på Lolland.

Fältförsök

Under våren har de första två försöken lagts ut och första

mellangrödan är sådd, engelskt rajgräs, som undersådd botengröda. Efter skörd kommer resterande grödor att sås, nämligen oljerättika, honungsört i renbestånd och tillsammans med blodklöver, bovete och råg.

Försöken är belägna utanför Klagstorp på Söderslätt och utanför Kristianstad. Senare i höst kommer vi bjuda in till visning av försöken. Projektet kommer att pågå i tre år och totalt kommer vi att lägga ut sex försök med mellangrödor.



Åsa Olsson Nyström
NBR Nordic Beet Research

Stockar från gamla betor

Vinterns debacle med oskördade betor sätter sina små spår in i årets växtodling. Som tur är verkar det ändå ha gått hyfsat bra, men håll koll efter fröstockar!

Visst finns det fält där vårspannmålen inte växer hundra efter att betor blivit kvar i jorden, men huvudintrycket är ändå att det inte står någon missväxt och knackar på dörren. Åtminstone inte orsakat av oskördade betor.

Fortsätt bevaka

Farhågan kring risken för fröstockar från kvarlämnade betor har inte heller den blommat ut till fullo.

Här är det dock fortfarande en uppmaning till bevakning. Vi har nu, i slutet av maj, lagt ut



Observera och åtgärda! Håll koll i vårspannmålen efter framväxande fröstockar från oskördade betor. Här med årsaktuellt exempel på hur de kan se ut.

ett försök i vårkorn med några olika strategier att hantera fröstockarna på.

I det aktuella försöksfältet är där nu, åtminstone över stora områden, mellan 2 000 och 6 000 framväxande fröstockar per hektar av Conviso-sort. Det är inte att leka med och här blir det viktigt med en robust ogräsbekämpning och eventuell efterföljande handrensning!

Merparten av stockarna verkar växa fram från förhållandevis små betor.

De som var större och hade nacken högt blev hårt åtgångna i kylan, men mindre "pellar", med nacken i markytan har haft bättre förutsättningar att klara av vintern och från dessa kan nu fröstockar växa fram.



Rikard Andersson
NBR Nordic Beet Research